

## **Mahdollisia syitä sairaalaan siirtymiselle kotisynnytyksestä:**

### **Ennen synnytystä:**

Pre-eklampsia (merkittävä verenpaineen nousu, proteiiniuria)

Raskauden ennenaikaisuus tai yliaikaisuus (<37 tai >42)

Perätila tai poikkitila

Aktiivinen genitaalierpes

Lapsiveden määrän poikkeavuus

GBS pos.

### **Synnytyksen aikana:**

Infektion oireet (kuume yli 38 astetta)

Epänormaalit sydänäänet

Vihreä lapsivesi

Pysähtynyt synnytys

Äidin väsymys

Puudutteen tarve

Ennenaikainen lapsivedenmeno

Sikiön normaalista poikkeava asento

Perheen halu siirtyä sairaalaan

Verenpaineen merkittävä nousu

### **Akuutit siirtymisen syyt:**

Istukan ennenaikainen irtoaminen

Kohdun repeämä

Napanuoran ulosluiskahdus

Runsas verenvuoto

Lapsivesiembolia

Kohtuprolapsi

Sydänäänten romahtaminen

### **Synnytyksen jälkeen:**

Istukkaretentio

3.-4.-asteen repeämä

Vastasyntyneen ongelmallinen vointi (mm. Apgar-pisteet alle 7 10min iässä, hapetus <94% yli 30 min iässä, hengitysvaikeudet, akuuttia hoitoa vaativat epämuodostumat)